

<https://doi.org/10.18004/rdn2026.e1800112-dict2>

GUÍA DE REVISIÓN POR PAR

ARTÍCULO ORIGINAL

Prevalencia de la fibrilación auricular en pacientes con Accidente Cerebro Vascular Isquémico

Resumen de su impresión comprensiva

Es un artículo importante y pertinente, porque contribuye a caracterizar una de las principales causas de accidente cerebrovascular isquémico, como es la fibrilación auricular, dentro de una población local. Sus hallazgos pueden aportar no solo a la comprensión epidemiológica del problema, sino también a la definición de políticas públicas, así como al fortalecimiento de estrategias de prevención primaria y secundaria, especialmente en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Aunque el grupo de hombres fue mayor dentro de la muestra global, el estudio mantiene concordancia con la literatura al mostrar un comportamiento relevante de la enfermedad cerebrovascular en el sexo femenino, lo cual merece especial atención. Además, considero que este trabajo puede servir como punto de partida para futuras investigaciones orientadas a establecer con mayor claridad la ruta de manejo del stroke y la importancia de la perfusión temprana.

Fortalezas del artículo

El artículo presenta como principal fortaleza la caracterización clínica de una población con ACV isquémico y fibrilación auricular, aportando datos puntuales que pueden servir como base para intervenciones clínicas y de salud pública. Resulta valioso que destaque la frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, lo que permite reforzar el enfoque preventivo tanto en atención primaria como en prevención secundaria. También considero positivo que el trabajo incorpore el análisis por sexo, ya que esto amplía la interpretación clínica y resalta la importancia del enfoque en mujeres dentro de la prevención cerebrovascular. Otro aspecto favorable es que ofrece información útil sobre trombólisis, antiagregación y estancia hospitalaria, elementos que pueden ser de utilidad para mejorar protocolos asistenciales y para generar nuevas líneas de investigación en el contexto del manejo del stroke.

Recomendaciones

De manera respetuosa, recomendaría fortalecer la discusión con una mayor comparación con estudios latinoamericanos, ya que esto enriquecería el análisis regional y permitiría contextualizar mejor los hallazgos. En el resumen, sería conveniente especificar explícitamente el número total de pacientes con ACV isquémico incluidos en el estudio, pues este dato aporta claridad inmediata al lector. Asimismo, sugiero resaltar de manera más precisa en la discusión y/o conclusiones que la mayoría de los pacientes egresaron con antiagregantes más que con anticoagulantes, en relación con el porcentaje de fibrilación

auricular encontrado, ya que este es un hallazgo clínicamente relevante y merece una interpretación más profunda. Finalmente, sería útil enfatizar aún más la proyección del estudio hacia futuras investigaciones orientadas a optimizar la ruta de atención del stroke y la reperusión temprana.

Dictamen

a. Aprobado: ...x....

b. Aprobado con modificaciones:

c. No aprobado (con sugerencias y reinicio del proceso):

Nombre y apellido: Tatiana Lucía Espínola Espitia

Fecha de la revisión: 26 de marzo de 2026

Filiación institucional: Universidad del Sinú. Montería, Colombia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7296-9238>